

Kdoulovec japonský, (japonská kdouloň)

(*Chaenomeles japonica*)

Znaky:

Opadavý keř, 1 až 2 m vysoký a až 3 m široký, vyhánějící četné kořenové výmladky. Větve trnité, rozestálé, v mládí plstnaté, později lysé. **Listy** střídavé, široce vejčité, na vrcholu tupé, na okraji hrubě pilovité, lysé, lesklé, 3 až 5 cm dlouhé, s palisty. **Květy** vyrůstají po 2 až 4, 5 četné, cihlově červené, s 5 čnělkami, přibližně 3 cm v průměru. **Plodem** je kulovitá, vonná, žlutozelená malvice, 4 až 5 cm v průměru. Kvete v dubnu a květnu.

Latinské rodové jméno je odvozeno od řeckých slov chainó = štípu a mélea = jabloň (kdoulovec má rozštěpený jádřinec a jeho plod se podobá jablku).

Rozšíření a využití:

Chaenomeles zahrnuje 4 druhy, které rostou ve východní Asii-Japonsku, převážně v nadmořských výškách 500 až 900 m. Do Evropy byl dovezen okolo roku 1800, u nás pěstován asi od roku 1865. Plody jsou jedlé, ale pro poněkud kyselou a svíravou chuť se obvykle nepojídají samostatně, spíše se přidávají jako dochucovadlo např. do sirupů, želé a pod. nebo se využívá jejich příjemné vůně (např. vložené do skříně brzy provoní v ní uložené oblečení). Pěstuje se v několika odrůdách a hodí se pro solitérní pěstování v zahradách nebo pro nižší živé ploty.

