

Pustoryl věncový, (pustoryl obecný, pustoryl větvený, nepravý jasmín, bledý pustoryl) (*Philadelphus coronarius*)

Znaky:

1 až 4 m vysoký keř. **Větve** vzpřímené, později mírně ohnuté, v mládí žlutohnědé a slabě chlupaté, později tmavohnědé, s odlupující se borkou. **Listy** vejčité, na bázi klínovité, na vrcholu zašpičatělé, v cca horních 2/3 zubaté, na spodní straně na žilkách a v jejich paždí chlupaté. **Květy** nejčastěji v 5 až 10 květých hroznech, intenzivně vonné, 4 četné, bílé až krémové, často se slabě žlutým nádechem. Kvete v červnu a červenci.

Rozšíření a využití:

Philadelphus zahrnuje asi 70 druhů, které rostou v jižní Evropě, na Kavkaze, ve východní Asii a v Severní a Střední Americe. Pochází pravděpodobně z oblasti od jižní Evropy (od Itálie) po Kavkaz, ale protože je již několik století pěstován a často zplaňuje, je velmi obtížné v současnosti přesně určit původní areál rozšíření. I v ČR je často pěstován a občas zplaňuje. Ve střední a západní Evropě se pěstuje od 16. století, od století 18. jej lze považovat za běžně pěstovaný keř, v současnosti se nabízí v mnoha odrůdách.

