

Šeřík obecný

(*Syringa vulgaris* L.)

Znaky:

Opadavý, pomalu rostoucí, až 10 m vysoký keř či menší stromek s daleko sahajícím kořenovým systémem a metlovitou korunou. Větévky v mládí hladké, kulaté a olivově zelené. Na starších větvích kůra šedohnědá, drsná, podélně popraskaná. Pupeny nestejně veliké, lemované nahnědlými okrouhlými šupinami.. Vstřícné **listy** mají 3 cm dlouhý řapík a vejčitou čepel, na bázi srdčitou nebo klínovitou a dlouhou špičkou. Husté, čtyřčetné **květy** tvoří až 20 cm dlouhé laty. Květy se objevují až po listech. Kveté od dubna do června. **Plodem** je dlouze vejčitá, dřevnatá, hnědě lesklá tobolka. **Semena** jsou kolem dokola křídlatá.

Rozšíření a využití:

Syringa zahrnuje asi 30 druhů, které primárně rostou v jihovýchodní Asii, 2 druhy i v jihovýchodní Evropě. Celá čeleď olivovitých (do které patří i šeřík) zahrnuje stromy a keře tropického a mírného pásma. Do Španělska šeřík přinesli Arabové a poté se rozšířil do celé Evropy. Šeřík se využívá hlavně jako okrasný keř. Éterické květní oleje se používají ve voňavkářství. Velmi tvrdé dřevo má jemnou strukturu a snadno se leští.

