

# Tavolník van Houtteův

(*Spiraea x vanhouttei*)

## Znaky:

Opadavý, rozkladitý, až 2,5 m vysoký keř. Letorosty oblé, zelenohnědé. **Listy** řapíkaté, klínovitě obvejčité až eliptické, v horní polovině pilovité, na starších větvích až 3laločné. **Květy** uspořádány v okolíčnatých hroznech, květenství nejprve ploché, později polokulovité, korunní lístky bílé, okrouhlé, tyčinky kratší než korunní lístky. **Plodem** je měchýřek. Kvete v červnu.

## Rozšíření a využití:

*Spiraea* zahrnuje okolo 80 druhů, které rostou převážně v mírném pásmu severní polokoule. Jedná se o uměle vypěstovaného křížence tavolníku kantonského (*Spiraea cantoniensis*, který je původem z Číny a Japonska) a tavolníku trojlaločného (*Spiraea trilobata*, který je původem ze severní Číny, Střední Asie a jižní Sibíře). Pěstuje se od roku 1868, na území současné ČR se pravděpodobně objevil jeho první exemplář v roce 1927 (v Průhonicích). V současnosti jde u nás o jeden z nejčastěji pěstovaných tavolníků vůbec. Jedná se o velmi nenáročný a odolný keř. Bývá vysazován buď soliterně nebo v živých plotech (dobře snáší sestřihování).

