

Vrba jíva (vrba obecná)

(*Salix caprea*)

Znaky:

Opadavý keř nebo strom dosahující výšky až 12 m. Kmen v průměru až 50 cm, **borka** zpočátku hladká, světle šedá, později podélně brázditá a tmavě šedá. **Listy** střídavé, eliptické, celokrajné nebo slabě vroubkované, na rubu šedobíle chlupaté, s vyniklou žilnatinou. **Květy** uspořádány v jehnědy, dvoudomé, rozkvétají před rašením listů v podobě známých "kočiček", před rozkvetem stříbřitě plstnaté, samčí vejcovité, žluté, samičí delší, zelenavé a po opylení se dále prodlužující. Vrba jíva se dožívá až 50 let a plodí ve věku 3 až 4 roky. Kvete v březnu a dubnu.

Rozšíření a využití:

Salix zahrnuje 300 až 600 druhů, které rostou téměř po celém světě vyjma Austrálie a Nového Zélandu, nejvíce pak v mírném a subarktickém pásmu severní polokoule. V ČR obecně od nížin až po hranici lesa, ojediněle i výš. Celkově roste v mírném a subarktickém pásmu Evropy a Asie. Vrba jíva je významnou medonosnou rostlinou. Jehnědy, čili kočičky, jsou s oblibou řezány pro okrasu. Měkké a pórovité dřevo vrby jívy bývá užíváno jako topivo. Jde o nenáročnou dřevinu, která dobře poroste téměř v jakékoliv půdě a na jakémkoliv slunném nebo polostinném stanovišti, jde o rostlinu často průkopnickou a mimořádně přizpůsobivou.

